

sommet. La fleur donne une odeur désagréable, mais moins fétide que celle que répand le *Rosa eglanteria punicea*.

Enumération des variétés connues du *R. EGLANTERIA*, extraite du Prodrôme de la monographie des espèces et variétés du genre Rosier, p. 99.

R. germinibus depresso-globosis, pedunculisque glabris, caule aculeis sparsis, rectis, petiolis scabris, foliis acutis. L. spec. plant. 703.

- α. *R. eglanteria lutea*. Du Roi, *Harb.* 2, p. 347.
R. lutea. AIT., Kew. 2, p. 200. WILLD. *Arb.* 303. Id., spec. 1064. MILLER, Dict., n° 11. Du R. l. c. p. 344. POIR., Ency. 6, p. 289, n° 20. CURT., Bot. Mag. tab. 363. NOUV. DUHAM. l. c. tab. 14, fig. 1.
R. eglanteria. SCHOLL., *Barb.*, n° 399. MOENCH., *Hass.*, n° 418. LEYSS., *Hall.*, n° 489, etc. RED. ROSES 1, p. et fig. 69.
R. lutea simplex. C. BAUH., *Pin.* 483. BESL., *Eyst.* tab. 5, fig. 1.
R. fetida. ALL., *Ped.*, n° 1792. Non BAST. Non DC.
R. cerea. ROESS. tab. 2. *L'Eglantier jaune*.
β. *R. eglanteria luteola*. THY. l. c. *L'Eglantier serin*. Arbrisseau moins grand que le précédent dans toutes ses parties.
γ. *R. eglanteria punicea*. Du R. l. c. CORN. *Canad.* 11. ROESS. tab. 5. RED. ROSES 1, p. et fig. 71.
R. lutea β. AIT. l. c. — var. β. WILLD. l. c. — β. POIRET, l. c. — β. DC. *Catal. Mompel.* p. 55.
R. eglanteria β. DC. Fl. Franç. édit. 3, 3694. — var. β. NOUV. DUHAM. l. c. p. 45. *L'Eglantier ponceau; la Rose capucine; la Rose d'Autriche*.

La *Rose tulipe* de DU PONT (*R. eglanteria tulipa*, *Gymn. Ros.* p. 15) est une sous-variété de ce Rosier.
 Ces arbrisseaux croissent en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et en Espagne.

